

Об исследовании Королевского колледжа Лондона

Исследователи **Королевского колледжа Лондона** на основе изучения данных о симптомах, которые наблюдались у **1,6 тыс.** пациентов с диагнозом **COVID-19 в США и Великобритании**, установили **6** типов коронавируса **SARS-Cov-2**.

При этом, как утверждают ученые, если первые **3** типа коронавируса считаются относительно лёгкими, то последние **3** становятся причиной тяжёлого течения болезни. Так, в то время когда только **16%** пациентов с **1** типом **COVID-19** нуждались в госпитализации, почти **50%** пациентов с **6** типом симптомов попала в больницу.

Исследователи отмечают, что **первый тип** похож на обычный грипп и, как правило, сопровождается: **а)** головной болью и потерей обоняния; **б)** мышечными болями, кашлем; **в)** болью в горле и в груди. Лишь **1,5%** заболевших этим типом нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

Второй тип включает в себя такие симптомы, как: **а)** потеря аппетита; **б)** головная боль и потеря обоняния; **в)** кашель, боль в горле; **г)** хрипота и лихорадка. При этом более **4%** пациентов нуждаются в искусственном поддержании дыхания.

Третий тип проявляется в виде желудочно-кишечных проблем. При этом у пациентов отсутствует кашель, но они испытывают головные боли. Также проявляются такие симптомы как: **а)** диарея, потеря обоняния и аппетита; **б)** боль в горле и груди. Чуть более **3%** требуется поддержание дыхания.

Четвёртый тип – т.н. «тяжёлый уровень **1**», проявляется в виде: **а)** усталости и головной боли; **б)** потери обоняния, кашля, лихорадки; **в)** хрипоты и боли в груди. Вероятность того, что им понадобится поддержка дыхания, составляет **8,6%**.

Пятый тип – «тяжёлый уровень **2**», также может включать в себя симптомы **4** типа, наряду с потерей аппетита, ангиной и мышечной болью. Этот тип, в основном, отличается невнятной симптоматикой и около **10%** пациентам требуется искусственное поддержание дыхания.

Шестой тип, известный как «тяжёлый уровень **3**», сопровождается всеми симптомами **5** типа, такими как боль в животе, одышка и диарея. Учитывая серьёзность данного типа, почти **50%** пациентов, столкнувшихся с этим типом, требуется госпитализация, а **20%** – поддержание дыхания.

В целом, по мнению экспертов, грамотное распределение пациентов по вышеуказанным типам позволит медикам использовать полученные результаты для того, чтобы при возможных последующих волнах пандемии лучше предугадывать, кто из пациентов подвергается большему риску и кому с большей вероятностью понадобится госпитализация.

6 типов COVID-19

